

**Διευκρινίσεις σχετικά με τη θεραπεία της
Σύφιλης**

**ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ
ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΕΟΔΥ**

ΑΘΗΝΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες (CDC, IUSTI, ΕΟΔΥ) η θεραπεία της σύφιλης στηρίζεται στην **Βενζαθενική πενικιλίνη** (Benzathine Benzylpenicillin G, BPG). Η BPG, μεταξύ άλλων, έχει παρατεταμένο χρόνο δράσης.

Το φάρμακο όμως είναι σε έλλειψη ή ανεπάρκεια τόσο διεθνώς όσο και στην Ελληνική αγορά. Εισάγεται από το ΙΦΕΤ και τα σκευάσματα είναι τα Benzetacil ή Moldamin κά, που χορηγούνται ενδομυϊκά.

Διευκρινίζεται ότι η Benzathine Benzylpenicillin G **δεν ταυτίζεται** με την απλή Benzylpenicillin G (PenG) ή κρυσταλλική πενικιλίνη, η οποία έχει πολύ μικρό χρόνο δράσης (ημιζωή ~30min), και μπορεί να χορηγηθεί ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια. *Η απλή Benzylpenicillin G είναι κατάλληλη μόνο για τη θεραπεία της νευροσύφιλης, σε ενδοφλέβια χορήγηση, σε δόσεις ανά 4ωρο.*

Έτσι, η απλή Benzylpenicillin G **δεν μπορεί να αντικαταστήσει** την Βενζαθενική πενικιλίνη στη θεραπεία της σύφιλης. Εάν ο ασθενής δεν μπορέσει να βρει σκεύασμα Βενζαθενικής πενικιλίνης, η εναλλακτική θεραπεία είναι η Δοξυκυκλίνη.

Υπενθυμίζονται τα θεραπευτικά σχήματα της σύφιλης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες:

- ΠΡΩΙΜΗ ΣΥΦΙΛΗ: Βενζαθενική πενικιλίνη G 2.400.000 I.U. ενδομυϊκά άπαξ
- ΟΨΙΜΗ ΣΥΦΙΛΗ: Βενζαθενική πενικιλίνη G 2.400.000 I.U. ενδομυϊκά ανά εβδομάδα, επί 3 εβδομάδες

Εναλλακτικά: Δοξυκυκλίνη 200 mg/24ωρο επί 14 ημέρες (πρώιμη σύφιλη) ή 28 ημέρες (όψιμη σύφιλη)

- ΝΕΥΡΟΣΥΦΙΛΗ (ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ Ή ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ): Βενζυλική (κρυσταλλική) πενικιλίνη 18-24.000.000 I.U. ενδοφλεβίως ημερησίως, χωρισμένη σε δόσεις ανά 4 ώρες, για 10-14 ημέρες

Εναλλακτικά: Κεφτριαξόνη 1-2gr x1 ενδοφλεβίως ημερησίως για 10-14 ημέρες

Οι πλήρεις κατευθυντήριες οδηγίες θεραπείας της σύφιλης και των άλλων Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ (<https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2022/10/odigies-smn-2022.pdf>).